

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**ОЛАЗОЛЬ®**

наименование лекарственного препарата

**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** ОЛАЗОЛЬ®

**Группировочное название:** Бензокаин+Борная кислота+Облепихи крушиновидной плодов масло+Хлорамфеникол

**Лекарственная форма:** аэрозоль для наружного применения

<b>Состав: на 1 баллон</b>	<b>80 г</b>
Облепихового масла	7,20 г
Хлорамфеникола	2,16 г
Бензокаина (анестезин)	2,16 г
Борной кислоты	0,36 г

*Вспомогательные вещества:*

Троламина	2,16 г
Ланолина безводного	0,36 г
Стеариновой кислоты	2,88 г
Глицерола	7,20 г
Воды очищенной	47,52 г
Смеси хладонов 22 и 142В (дифторхлорметан+дифторхлорэтан)	8,00 г

**Описание:** препарат при выходе из баллона образует пену желтого или желтого со слегка оранжевым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное средство комбинированное.

**Код АТС:** [D08AX]

**Фармакологические свойства:**

Ранозаживляющее средство. Оказывает анестезирующее и антибактериальное действие, уменьшает экссудацию, способствует регенерации тканей и ускоряет процесс эпителизации ран.

**Показания к применению:**

Инфицированные раны (в т.ч. вялозаживающие раны), трофические язвы, ожоги, свободная кожная пластика, микробная экзема, зудящий дерматит.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**

Сведения отсутствуют.

**Способ применения и дозы:**

Наружно. Раневую поверхность по возможности очищают от гноя, некротических тканей и покрывают равномерным слоем пены ежедневно или через день, а при открытом лечении ран и ожогов - 1-4 раза в сутки, в зависимости от характера воспаления и стадии регенерации поврежденных тканей. Курс лечения определяется индивидуально лечащим врачом.

Для получения равномерного слоя пены баллон необходимо встряхнуть (10-15 раз). Пену наносят до покрытия всей раневой поверхности, с расстояния 1-5 см.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции. При проявлении побочных реакций необходимо отменить применение препарата и обратиться к врачу.

**Передозировка:**

Сведения о передозировке препаратом отсутствуют.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:**

В период лечения возможно использование системной антибактериальной терапии.

Возможность и необходимость применения с другими наружными лекарственными средствами определяется индивидуально лечащим врачом в зависимости от характера воспаления и стадии регенерации поврежденных тканей.

**Особые указания:**

Не влияет на способность управлять автотранспортом или работу с другими потенциально опасными механизмами.

**Форма выпуска:**

По 80 г в баллонах алюминиевых. Каждый баллон в пачке из картона.

**Условия хранения:**

В сухом месте, при температуре не выше 15 °С, вдали от источников огня, отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/организация, принимающая претензии:**

ЗАО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Телефон: (3854) 326-946, 338-719

Факс: (3854) 327-640

Генеральный директор

ЗАО «Алтайвитамины»



Ю.А.Кошелев